

Tabell 1. Klassifikasjon av epileptiske anfall

1. Fokal

- 1.1. Fokal bevart bevissthet (FB)
- 1.2. Fokal redusert bevissthet (FR)
- 1.3. Fokal til bilateral tonisk-klonisk (FTK)

Anfallsbeskrivelse (deskriptorer)

- **Basal:**
 - Med observerbare symptomer
 - Uten observerbare symptomer
- **Utvidet:**
 - Semiologiske deskriptorer i kronologisk rekkefølge*
Semiologiske funn* + kroppsdel og side

2. Ukjent om fokal eller generalisert

- 2.1. Ukjent om fokal eller generalisert bevart bevissthet
- 2.2. Ukjent om fokal eller generalisert redusert bevissthet
- 2.3. Ukjent om fokal eller generalisert tonisk-klonisk

Anfallsbeskrivelse (deskriptorer)

- **Basal:**
 - Med observerbare symptomer
 - Uten observerbare symptomer
- **Utvidet:**
 - Semiologiske deskriptorer i kronologisk rekkefølge*
Semiologiske funn* + kroppsdel og side

3. Generalisert

- 3.1. Absensanfall
 - 3.1.1. Typisk absens
 - 3.1.2. Atypisk absens
- 3.2. Generalisert tonisk-klonisk (GTK)
- 3.3. Andre generaliserte anfall**
 - 3.3.1. Generalisert myokloni
 - 3.3.2. Generalisert klonisk
 - 3.3.3. Generalisert negativt myokloni
 - 3.3.4. Generalisert epileptisk spasme
 - 3.3.5. Generalisert tonisk
 - 3.3.6. Generalisert atonisk
 - 3.3.7. Generalisert myoklon-atonisk

4. Uklassifisert

* Se Tabell 2 i Beniczky et al 2025 for liste over deskriptorer ved fokale og ukjente anfall i

** Dette er en gruppebetegnelse, ikke en definert anfallstype

Anfallstyper er skrevet i **svart**, anfallsbeskrivelse (deskriptorer) i **blått**.

Basal anfallsklassifikasjon

Fokalt	Ukjent om fokalt eller generalisert	Generalisert
Bevissthet ^{1,2} <ul style="list-style-type: none">• Bevart• Redusert	Bevissthet ^{1,3} <ul style="list-style-type: none">• Bevart• Redusert	<ul style="list-style-type: none">• Absensanfall• Andre generaliserte anfall
Fokalt til bilateralt tonisk-klonisk anfall	Bilateralt tonisk-klonisk anfall	Generalisert tonisk-klonisk anfall
Basal anfallsbeskrivelse: med/uten observerbare ⁴ symptomer		Uklassifisert

¹ Bevissthet vurderes ut fra respons under anfallet og erindring av anfallet.

² Når bevissthetspåvirkning er ukjent, klassifiseres anfallet som fokalt (uten angivelse av bevissthetspåvirkning).

³ Hvis bevissthetspåvirkning er ukjent, klassifiseres anfallet som ukjent om fokalt eller generalisert (uten angivelse av bevissthetspåvirkning).

⁴ Observerbare symptomer kan gjenkjennes av et øyenvitne. Disse kan være motoriske, språklige, autonome eller andre.

Utvidet anfallsklassifikasjon

Fokalt	Ukjent om fokalt eller generalisert	Generalisert
Bevissthet ^{1,2} <ul style="list-style-type: none">• Bevart• Redusert	Bevissthet ^{1,3} <ul style="list-style-type: none">• Bevart• Redusert	<ul style="list-style-type: none">• Typisk absens• Atypisk absens• Myoklon absens• Øyelokksmyokloni med/uten absens• Myokloni⁵• Negativ myokloni⁵• Klonisk⁵• Epileptisk spasme⁵• Tonisk⁵• Myoklon-atonisk• Atonisk⁵
Fokalt til bilateralt tonisk-klonisk anfall	Bilateralt tonisk-klonisk anfall	Generalisert tonisk-klonisk anfall
Utvidet anfallsbeskrivelse: Semiologiske deskriptorer i kronologisk rekkefølge ⁴ , inklusiv fokal epileptisk spasme, myokloni og tonisk-klonisk		Uklassifisert

¹ Bevissthet vurderes ut fra respons under anfallet og erindring av anfallet.

² Når bevissthetspåvirkning er ukjent, klassifiseres anfallet som fokalt (uten angivelse av bevissthetspåvirkning).

³ Hvis bevissthetspåvirkning er ukjent, klassifiseres anfallet som ukjent om fokalt eller generalisert (uten angivelse av bevissthetspåvirkning).

⁴ Semiologiske deskriptorer kan være motoriske, kognitive (inkludert språklige), autonome, sensoriske eller affektive.

⁵ Disse fenomenene kan også forekomme ved fokale anfall (unilaterale eller asymmetriske) som del av semiologien ved fokale anfall.